

BUPRESTIDES RÉCOLTÉS PAR LE D^r HORN A CEYLAN

par A. Théry.

Mon ami le D^r W. Horn, de Berlin, a bien voulu me confier l'étude des Buprestides récoltés par lui, durant son séjour à Ceylan; je dois à son extrême obligeance l'abandon des exemplaires uniques que renfermaient ses récoltes.

Motschulsky, dans son catalogue publié en 1861, signale vingt espèces de Buprestides habitant Ceylan; ce chiffre, par suite de synonymie, doit se réduire à dix-neuf. Walker avait, avant Motschulsky, décrit quatre espèces de ce pays qui figurent dans le catalogue de l'auteur russe. Les descriptions de Walker sont tellement simplifiées qu'il est absolument impossible de les utiliser. Je me suis efforcé cependant, en me basant sur la taille et la couleur indiquées, de ne pas redécrire d'espèces déjà décrites par lui; j'espère y être arrivé. Depuis le travail de Motschulsky, une douzaine d'espèces ont été publiées çà et là par divers auteurs; enfin, je décris dans ce travail quatorze espèces nouvelles et quelques variétés, ce qui porte à une trentaine le nombre de Buprestides connus de ce pays. Je suppose, étant donné ce petit nombre d'espèces, qu'il doit y avoir encore beaucoup à trouver dans cette île située dans une des parties du monde les plus riches en Buprestides.

LISTE DES ESPÈCES

1. STERNOCERA STERNICORNIS L., 1 ex. — Kandy.

2. CATOXANTHA SARRAZINORUM Flach, 1 ex. — Mitintale.

Cette espèce est bien distincte du *C. Castelnaudi* H. Dey.; les trois derniers segments abdominaux sont bruns, non métalliques; le prothorax n'a que des fossettes absolument superficielles, et sa forme est élargie et analogue à celle du *C. opulenta* Gor.

3. CHRYSOCHIROA IGNITA L., 1 ex. très grand. — Negombo.

4. IRIDOTENIA SULCATA Thunb., 1 ex. — Kantaly.

5. PSILOPTERA CUPREOSPLENDENS Saund., 3 ex. — Nalanda, etc.

6. CASTALIA BIMACULATA L., 3 ex. — Pankulam.

7. PTOSIMA AMALIBIS C. et G., 2 ex. — Nalanda.

Contrairement à l'opinion émise par Kerremans, la figure de Castelnau et Gory, concernant cette espèce, est bien exacte; les exemplaires du Chota-Nagpore appartiennent à une variété, pour laquelle

je propose le nom de *hieroglyphica*, caractérisée par un très grand développement des taches jaunes, par une tache apicale sur les élytres, qui n'existe pas chez la forme type, et par les cuisses testacées. A première vue, les deux formes paraissent appartenir à deux espèces différentes, mais je n'ai pu trouver d'autres caractères pour les séparer, et ceux-ci sont insuffisants.

8. SPHENOPTERA GOSSYPH Kerr., 2 ex. — Anuradapura.

9. SPHENOPTERA PERROTETI Guer. — Commun partout.

Je signale ici quelques variétés de cette espèce. Cinq exemplaires sont d'une taille plus petite, avec les côtés du prothorax absolument parallèles et même quelquefois incurvé; un exemplaire a le prothorax globuleux; un autre, pour lequel je propose le nom de *rugosiventris*, a l'abdomen fortement rugueux avec le dessus moins brillant et la ponctuation du prothorax plus forte; l'aspect général de l'insecte se trouve ainsi fort modifié. Le *Sphenoptera Perroteti* Guer. ainsi que ses variétés ont souvent le prothorax dépourvu de sillon au milieu; cette espèce se distingue toujours facilement du *S. Gossypii* Kerr., ce dernier ayant le front séparé de l'épistome par une carène entière et saillante.

10. **Sphenoptera Horni** nov. sp. — Long. 9 mill.; larg. 3 mill. — *Allongé, cunéiforme, d'un bronzé obscur, plus brillant sur le prothorax; dessous bronzé avec l'abdomen à reflets pourprés.*

Tête légèrement concave, grossièrement ponctuée avec la carène des cavités antennaires saillante en avant; prothorax presque carré, droit sur les côtés, bisinué à la base, tronqué droit au devant de l'écusson, bordé sur la moitié postérieure de sa longueur d'une carène lisse aplatie, avec les angles postérieurs aigus et un peu prolongés en arrière, à ponctuation dense sur les côtés, fine et espacée sur le disque, légèrement sillonné dans sa longueur. Écusson transversal, court, bombé en forme de bourrelet. Élytres à peine plus larges que le prothorax à la base, avec le calus huméral peu saillant, finement rugueux et ornés de séries longitudinales de points sans stries marquées, tricarénés et triépineux au sommet avec l'épine externe peu saillante. Dessous fortement ponctué, avec les hanches postérieures munies d'une fine épine dirigée en dedans, le dernier segment abdominal court, la saillie du prosternum plane et entourée d'un sillon.

Cette espèce est voisine de *S. Perroteti* Guer., dont elle se distingue par la carène des cavités antennaires beaucoup plus saillante, son écusson plus court et caréné, ses hanches postérieures épineuses, enfin par le dernier segment abdominal du ♂, plus court et plus fortement échancré. — 1 exemplaire. — Kanthaley.

11. **Chrysobothris musæ** nov. sp. — Long. 10 mill.; larg. 4 mill. — *Oblong-ovale, subparallèle, peu convexe, front d'un rouge sombre, éclatant derrière les yeux et sur le vertex, prothorax d'un noir bléâtre bordé antérieurement de rouge, élytres vert olive à impressions plus claires, dessous vert au milieu, tarses et tibias postérieurs bleu d'acier.*

Tête plane, finement ponctuée, légèrement pubescente, avec deux carènes transversales en arc de cercle sur le front, couverte en avant de rides concentriques; pronotum transversal, couvert de petites lignes parallèles, sillonné derrière la marge antérieure qui est presque droite, avec les angles antérieurs aigus, les côtés sinués au milieu, les angles postérieurs arrondis, la base bisinuée avec le lobe médian légèrement tronqué. Écusson petit. Élytres finement et densément ponctués, avec une fossette sur le lobe basal, une derrière le calus huméral peu marquée, une au milieu du disque et une vers le tiers supérieur plus forte et plus rapprochée des bords; une côte longe la suture à une certaine distance de celle-ci; du sommet au tiers antérieur, une autre côte, qui au sommet est confondue avec la première, suit le bord latéral jusqu'au milieu; une petite côte rudimentaire existe aussi sur le disque. — 2 exemplaires pris sur un bananier. — 2 ex. — Hovonapotaïn.

NALANDA nov. gen.

Front bombé sans impression, cavités antennaires grandes, arrondies, normales, antennes médiocres s'insérant dans deux profonds sillons situés sur les bords mêmes du prothorax. Prothorax rétréci en avant, très bombé au milieu, avec un lobe tronqué à la base. Écusson assez grand en triangle régulier. Élytres assez allongés, atténués postérieurement, un peu cunéiformes.

Ce genre, voisin des *Meliborus*, s'en distingue par la gouttière où viennent se loger les antennes; plusieurs espèces indo-malaises rentrent évidemment dans cette coupe; les espèces que je connais ont leur ponctuation remplacée sur tout le dessus par des stries transversales nettes et profondes.

12. **Nalanda Horni** n. sp. — Long. 3 mill. larg.; 1 mill. — *Entièrement cuivreux rougedâtre, sauf le front qui est d'un vert métallique.*

Tête saillante, régulièrement arrondie en avant, presque de moitié plus étroite que le pronotum; front aussi large en haut qu'en bas, plus étroit au milieu, avec les cavités antennaires grandes, arrondies, entièrement fermées en avant par les prolongements

latéraux de l'épistome, séparées du bord par un intervalle égal à la largeur de la cavité et séparées entre elles par une pareille distance; épistome échancré en avant, ponctuation formée de gros points enfoncés sur un fond finement ponctué, vertex lisse, avec de fines stries très nettes, profondes et peu serrées. Prothorax transversal, rétréci en avant, ayant sa plus grande largeur un peu avant le milieu, la marge antérieure un peu saillante, lisse, bordée d'un fin sillon, les angles antérieurs un peu saillants, très aigus, les bords latéraux légèrement sinueux à hauteur des hanches antérieures, les angles postérieurs droits, la marge postérieure très largement et peu profondément bisinuée, avec le lobe médian large, tronqué carrément, le disque très bombé, avec une large impression qui l'entoure en arrière, lisse, couvert de fines stries circulaires ayant leur centre un peu en avant de l'écusson; ces stries ne sont pas régulières mais en zigzag, avec les intervalles lisses sans aucune ponctuation. Écusson transversal imperceptiblement ponctué, droit à la base, incurvé sur les côtés. Élytres très convexes, aussi larges aux épaules que le prothorax en son milieu, un peu rétrécis dans leur moitié postérieure, ayant à hauteur des hanches la même largeur qu'aux épaules, puis atténués jusqu'à l'extrémité où ils sont isolément arrondis et garnis de 5 à 6 très petits denticules, disque de l'élytre sans impressions, avec le calus huméral bien marqué, orné de fines stries transversales très nettes, auxquelles sont régulièrement accolés de petits points. Saillie du prosternum large, rebordée, grossièrement ponctuée, dessous couvert de petites stries en forme d'écailles très régulièrement disposées par séries; bords inférieurs du prosternum creusés, tout contre la marge, d'un sillon profond et étroit dans lequel les antennes viennent se loger, pattes grêles, cuisses étroites, tibias légèrement incurvés, tarses très courts. — 1 ex. — Nalanda.

13. **Agrilus Horni** nov. sp. — Long. 6,5-7 mill.; larg. 1,5-1,7 mill. — *Allongé, subparallèle, peu convexe, bronzé avec des dessins formés par de petites squamules dorées.*

Tête rugueusement ponctuée sur le front, avec de petites stries longitudinales sur le vertex, le sommet de la tête présentant deux tubercules peu saillants, séparés par un sillon profond. Pronotum transversal presque rectangulaire, fortement impressionné au devant de l'écusson, avec une plus petite impression sur le disque, ridé transversalement, marge antérieure presque droite, les angles antérieurs abaissés, les postérieurs obtus, la base bisinuée avec le lobe médian peu saillant. Écusson grand, lisse, subpentagonal, terminé en pointe aiguë, traversé par une carène. Élytres déprimés, avec une légère carène le long des bords vers le sommet, le calus

huméral assez saillant et caréniforme, ayant leur plus grande largeur vers le tiers postérieur, recouvrant complètement l'abdomen, finement denticulés à l'extrémité, couverts de rugosités simulant des écailles, ornés de quelques taches dorées sur le disque et de 2 fascies préapicales irrégulières de même couleur. Dessous bronzé, finement ponctué, finement pubescent, mentonnière du prosternum large et séparée du prosternum par un sillon très net. — 5 ex. — Nalanda.

14. **Agrilus aurociliatus** nov. sp. — Long. 5 mill.; larg. 1,25 mill. — *Allongé, un peu élargi en avant, peu convexe, bronzé, avec le front vert bordé d'une pubescence dorée et les élytres ornés d'une tache circulaire dénudée, placée au tiers postérieur sur la suture.*

Tête rugueuse, légèrement sillonnée sur le vertex; pronotum élargi en avant, avec une forte impression allongée en avant de l'écusson, couvert de fines rides transversales entremêlées de points, presque droit sur les côtés, avec les angles postérieurs droits, la base fortement bisinuée, le lobe médian peu saillant, tronqué, sinué. Écusson moyen, transversal, fortement caréné. Élytres finement granuleux, déprimés en dessus, légèrement impressionnés le long de la suture, avec le calus huméral bien marqué, peu saillant, les côtés fortement échancrés à hauteur des hanches, ayant leur plus grande largeur au tiers supérieur, séparément arrondis et finement denticulés à l'extrémité, couverts d'une fine pubescence grisâtre. Dessous bronzé violacé, avec les cuisses postérieures assez renflées, vertes. — 1 ex. — Nalanda.

15. **Agrilus Nalandæ** nov. sp. — Long. 4,5 mill.; larg. 1,2 mill. — *Allongé, subparallèle, peu convexe, d'un bronzé doré, avec les élytres d'un noir violacé, garnis d'une pubescence dorée formant des dessins.*

Tête presque aussi large que le pronotum, plane sur le front, légèrement sillonnée sur le vertex, granuleuse. Pronotum un peu plus large que long, peu courbé sur les côtés, un peu plus large en avant qu'en arrière, avec la marge antérieure fortement saillante et les angles antérieurs très aigus, la carène postérieure très courte, la marge postérieure bisinuée avec le lobe médian tronqué, le disque largement impressionné en demi-cercle et couvert de petites stries entremêlées. Écusson transversal caréné, terminé en pointe fine. Élytres couverts de rugosités en forme d'écailles, avec le calus huméral portant une petite carène à peine saillante, à côtés fortement sinueux à hauteur des hanches, fort élargis vers le tiers postérieur, conjointement arrondis et excessivement finement denticulés au sommet avec la suture finement rebordée du sommet au

tiers supérieur, ornés de dessins assez vagues dont un se trouve sur le bord de l'élytre à son point de plus grande largeur et un autre formant une fascie transversale un peu avant le sommet. Abdomen débordant les élytres, dessous entièrement d'un bronzé doré pubescent, tarsi noirâtres. — 1 ex. — Nalanda.

16. **Agrilus Kandyanus** nov. sp. — Long. 6,5 mill.; larg. 1,5 mill. — *Allongé, bronzé, d'un vert olivâtre à reflets pourprés en dessus, vertex irisé.*

Tête presque aussi large que le prothorax, légèrement sillonnée sur le vertex, à ponctuation granuleuse disposée en zones concentriques sur le front, cette ponctuation se transformant brusquement sur le vertex en strigosités fines, disparaissant sur l'arrière de la tête qui est presque lisse; front séparé de l'épistome par une fine carène saillante; épistome large rugueusement ponctué, avec un rebord élevé, lisse en avant; antennes courtes n'atteignant pas la base, à 1^{er} article médiocre, lisse, d'un cuivreux éclatant, les derniers très serrés, renflés, pubescents. Prothorax transversal avec la marge antérieure légèrement arrondie et bordée d'une fine strie, les angles postérieurs arrondis, la carène latérale sinueuse, la carène supérieure partant de l'angle antérieur s'éloignant d'abord peu de la précédente, puis décrivant une courbe pour aller la rejoindre à la base, la carène inférieure presque droite; la base bisinuée avec le lobe médian largement tronqué et sinué, le disque avec de fines stries transversales serrées et profondes, parallèles entre elles et formant un arc de cercle ouvert en avant, légèrement sillonné longitudinalement et creusé en gouttière le long de la carène supérieure, le fond de cette gouttière rugueusement ponctué. Écusson transversal, grand, traversé par une carène aiguë. Élytres de la largeur du prothorax, recouvrant entièrement l'abdomen, granuleux à la base et couverts sur le disque de fines strigosités, rebordés à la base par une fine carène qui contourne le calus huméral, impressionnés derrière ce calus, légèrement sinués à hauteur des hanches, finement denticulés à l'extrémité et isolément arrondis; dessous à ponctuation fine et à pubescence plus longue et plus dense sur les côtés des segments abdominaux, cuisses un peu renflées, tibiai et tarsi grêles. — 1 ex. — Kandy.

17. **Agrilus atomus** nov. sp. — Long. 3,25 mill.; larg. 0,75 mill. — *Médiocrement allongé avec le front rouge et garni dans le bas de gros poils blancs.*

Tête grosse et saillante, un peu moins large que le pronotum; front bombé, sillonné et circulairement impressionné sur le vertex, plus large en haut qu'en bas, non distinctement séparé de l'épistome qui est large et court; ponctuation fine et peu visible, par-

courue par de fines stries entremêlées, garnie dans le bas de longs et gros poils blancs peu serrés, ces poils devenant plus courts le long des yeux. Prothorax plus large en avant qu'en arrière, avec le bord antérieur bisinué, bordé d'une fine strie, le lobe médian et les angles antérieurs assez saillants, ceux-ci aigus à sommet arrondi; les bords latéraux parcourus par une carène sinueuse entière, la carène supérieure partant de l'angle postérieur et venant, après une courbe assez régulière, rejoindre la carène latérale au milieu de sa longueur; l'inférieure part du sommet de l'angle antérieur un peu en dessous de l'origine de la carène principale, suit presque parallèlement celle-ci, et la rejoint vers le milieu; les angles postérieurs droits, la marge postérieure fortement bisinuée, avec le lobe médian tronqué, droit; disque assez bombé, sans ponctuation distincte, brillant, avec des stries transversales courbes, se transformant en une ponctuation rugueuse dans les angles antérieurs. Écusson transversal, moyen, terminé par une pointe très fine, caréné transversalement, finement ponctué. Élytres un peu plus larges que le prothorax à la base, avec le calus huméral peu saillant, subparallèles, un peu dilatés à hauteur des hanches postérieures, légèrement sinués avant l'extrémité qui est munie de quelques denticules extrêmement petits, suture bordée postérieurement d'une fine carène, base rebordée par une carène derrière laquelle se trouve une large impression, disque brillant, à ponctuation formée derrière les épaules de petites strioles transversales, à aspect général granuleux, à pubescence très fine et éparse; dessous très brillant, finement ponctué, à pubescence d'un blanc soyeux. — 1 ex. — Kekiawa.

18. **Agrilus Motschulskyi** nov. sp. — Long. 6,5 mill.; larg. 1,75 mill. — *Allongé, assez robuste, bronzé cuivreux en dessus. Tête et prothorax à reflets rougeâtres, couvert d'une pubescence grise passant par place au jaune doré.*

Tête formant en avant une courbe régulière un peu aplatie se prolongeant sur les côtés du prothorax; vertex sillonné avec une petite carène située à peu de distance du sommet des yeux. Épistome étroit, bordé, ainsi que les cavités antennaires, d'un fin bourrelet lisse, entièrement réticulée, garnie sur l'épistome d'une pubescence dorée avec quelques poils gris et d'une légère bordure de poils également gris le long du bord antérieur des yeux. Antennes assez longues. Prothorax plus large que la tête, ayant sa plus grande largeur un peu avant le sommet, régulièrement arrondi et très légèrement sinué avant les angles postérieurs, avec la marge antérieure saillante au milieu, les angles antérieurs saillants mais recourbés en dessous à l'extrémité, la carène latérale très sinueuse, assez éloignée de l'inférieure qui atteint presque la base; la carène

supérieure rejoignant la carène latérale vers la moitié; disque impressionné sur les côtés avec deux grosses et larges impressions sur la ligne médiane, et la ponctuation formée de stries transversales. Écusson transversal, muni de deux carènes dont l'antérieure est excessivement finement crénelée. Élytres bordés à la base d'une carène presque droite, fine et très saillante, crénelée, laissant en dehors la saillie de l'élytre qui pénètre dans le sinus du prothorax qui est lisse et brillante, à côtés presque parallèles, ayant leur plus grande largeur vers le tiers postérieur, séparément arrondis et denticulés à l'extrémité, couverts de rugosités en forme d'écailles et d'une pubescence blanche, courte, espacée et régulière. Les segments abdominaux, plus larges que l'élytre, sont visibles par dessus et couverts d'une pubescence dorée en dessus, grise en dessous. — 1 ex. — Nalanda.

19. **Agrilus Walkeri** nov. sp. — Long. 3.5 mill.; larg. 1 mill. — *Court, peu atténué postérieurement, entièrement d'un bronzé verdâtre, plus clair sur la tête et le pronotum.*

Tête plus étroite que le pronotum, avec le front saillant entre les yeux, sillonnée; épistome un peu transverse, couvert, ainsi que la base du front, de gros poils blancs; ponctuation formée de gros points peu profonds sur un fond finement granuleux. Prothorax un peu élargi en avant, avec la marge antérieure saillante au milieu et bordée d'une fine strie, la carène latérale droite, la carène inférieure parallèle et très distante de la latérale qu'elle rejoint vers la base, la supérieure formant une courbe très accentuée et régulière rejoignant la carène latérale en son milieu, les angles postérieurs obtus, la marge postérieure peu profondément trisinuée, le disque parcouru par des stries transversales irrégulières, ponctué entre les stries et impressionné au devant de l'écusson. Écusson transversal, arrondi à la base, traversé par une carène finement crénelée. Élytres un peu plus larges que le prothorax à la base, où ils ont leur plus grande largeur, un peu rétrécis à hauteur des hanches et laissant voir une très petite partie des segments abdominaux, conjointement arrondis et finement denticulés à l'extrémité. Suture bordée d'une fine carène, la base des élytres également carénée, la carène basale finement crénelée et suivant les sinuosités du prothorax; disque avec une large impression à la base, à ponctuation finement granuleuse, à pubescence grise et rare; dessous fortement ponctué. — 1 ex. — Nalanda.

20. **AGRILUS ARMATUS.** — 2 ex. — Kanthaley.

21. **APHANISTICUS ARCUATICOLLIS** Mots. — 8 ex. — Nalanda.

22. **Trachys Horni** nov. sp. — Long. 2,5 mill.; larg. 1,5 mill. — *Subhexagonal, arrondi en arrière, peu convexe, entièrement bronzé,*

couvert de poils assez longs, dorés, clairsemés, avec des taches de pubescence blanche argentée sur les élytres, dessous noir brillant très peu pubescent.

Tête couverte de petites cicatrices superficielles, front fortement concave, avec les carènes oculaires arrondies et un très profond sillon longitudinal au-dessus de l'épistome qui est finement granuleux, échancré en avant et muni de prolongements latéraux. Pronotum très large, couvert d'une ponctuation semblable à celle de la tête, avec la marge antérieure échancrée en courbe aplatie au sommet, avec les angles antérieurs aigus, les côtés déprimés, régulièrement arqués, les angles postérieurs obtus, la marge postérieure sinueuse, relevée en carène, avec le lobe médian grand, triangulaire, très étroitement tronqué au sommet. Écusson très petit, triangulaire, lisse. Élytres à ponctuation grossière, cicatricielle, d'aspect rugueux, avec le rebord basal relevé en fine carène, impressionnés au-dessus du calus huméral qui est assez saillant, ayant leur plus grande largeur à l'épaule, un peu dilatés avant le tiers postérieur, conjointement arrondis à l'extrémité, avec l'angle sutural bien marqué, les dessins formés par la pubescence sont assez vagues; sur les exemplaires bien frais on remarque une tache ronde de chaque côté de la suture avant le milieu et deux fascies situées vers le sommet et très irrégulières. — 7 ex. — Bentotta.

23. *Trachys bellicosa* nov. sp. — Long. 2 mill.; larg. 1 mill. — *Ovale, peu dilaté antérieurement, assez bombé en dessus, bronzé, orné d'une rare et grossière villosité blanche, formant quelques taches irrégulières sur les élytres, dessous noir.*

Tête lisse, brillante, avec une ponctuation analogue à celle de *T. Horni*, front fortement excavé, avec le fond de l'échancrure sillonné, les carènes oculaires lisses, bien prononcées, l'épistome large, dilaté au sommet, rebordé par une petite carène. Pronotum beaucoup plus large que haut, ponctué comme la tête, sinué en avant, avec les angles antérieurs très aigus, les côtés aplanis, régulièrement arqués, un peu sinués avant les angles postérieurs qui sont obtus, la marge postérieure sinueuse, légèrement relevée en carène, avec le lobe médian assez saillant, arrondi au sommet. Élytres couverts d'une grossière ponctuation cicatricielle, ayant leur plus grande largeur à hauteur du calus huméral qui est assez saillant, impressionnés au-dessus de celui-ci, légèrement dilatés sur les côtés à la hauteur du tiers antérieur et conjointement arrondis à l'extrémité. La pubescence forme deux vagues fascies plus ou moins anastomosées vers l'extrémité.

Cette espèce se distingue de la précédente par sa forme beaucoup plus étroite, la carène oculaire saillante, etc. — 1 ex. — Anuradhapuria.

24. **Trachys pretiosus** nov. sp. — Long. 2 mill.; larg. 1 mill. — *Ovalaire, assez bombé en dessus, bronzé clair, brillant, orné d'une longue villosité argentée formant sur les élytres quatre taches peu apparentes; dessous noir.*

Tête large, très peu saillante, sans ponctuation bien distincte, sillonnée sur le vertex, le sillon aboutissant à une forte impression qui occupe la base du front, carènes oculaires peu saillantes mais bien marquées, épistome large, échancré et de même forme que chez *T. Horni*. Pronotum transversal, peu distinctement ponctué, avec la marge antérieure un peu saillante au milieu, les angles antérieurs aigus, les bords latéraux excessivement finement crénelés, les angles postérieurs droits, la marge postérieure assez fortement relevée en carène, sinueuse, avec le lobe médian arrondi. Écusson très petit, triangulaire, lisse. Élytres couverts d'une grosse ponctuation cicatricielle, relevés à la base en fine carène, ayant leur plus grande largeur à l'épaule, avec le calus huméral peu saillant, subparallèles jusqu'au tiers supérieur, puis atténués en courbe jusqu'à l'extrémité où ils sont conjointement arrondis; disque légèrement impressionné derrière le calus huméral, avec une vague impression de chaque côté de la suture, vers le tiers supérieur.

Distinct des précédents par son front non excavé en arc de cercle. — 1 ex. — Anuradhapurja.

25. **Trachys centrimaculatus** nov. sp. — Long. 2,5 mill.; larg. 1,5 mill. — *Bombé, les élytres formant une partie d'ovale parfait, la tête et le prothorax formant un trapèze; noir à reflets bronzés, orné de dessins de pubescence grise formant une grande tache grise au milieu de la suture des élytres et deux fascies en zigzag bien nettes vers l'extrémité; dessous noir.*

Tête large, assez excavée, à carènes oculaires bien marquées mais visibles seulement de face, sillonnée dans son milieu, à épistome large, échancré; pronotum très large, court, à ponctuation formée de petites cicatrices rondes avec un point au milieu, avec le bord antérieur saillant au milieu et longé d'une très fine strie, les angles antérieurs peu saillants et peu aigus, les côtés presque droits, les angles postérieurs droits, la base sinueuse avec le lobe médian très large, peu saillant et arrondi, la marge postérieure légèrement relevée en carène, Écusson bien visible, en triangle allongé. Élytres sans ponctuation bien définie, d'aspect rugueux, relevés à la base en fine carène, ayant leur plus grande largeur à l'épaule, avec le calus huméral peu saillant, atténués en courbe régulière jusqu'à l'extrémité où ils sont conjointement arrondis, impressionnés sur le disque, derrière le calus huméral. — 2 ex. — Bentotta.
